# *Avifauna de playas y dunas costeras de Atacama*

- El borde costero constituye un tipo de humedal enormemente diverso, rico en especies, y vital en el sostén de la economía de escala, la autosubsistencia local, y la sostenibilidad de recursos naturales necesarios para el bienestar social.

- Entre toda la diversidad posible de encontrar en la costa, la avifauna representa un grupo esencial para mantener la dinámica ecológica de estos ambientes, encontrándolas abundantemente en grupos que pueden superar los miles de aves, o dispersas dependiendo de la especie; desarrollando su vida completa aquí, o llegando de forma cíclica y anual luego de vuelos migratorios que pueden alcanzar incluso cerca de 15 mil kilómetros entre por ejemplo, Canadá o Alaska y Chile.

  En estas playas y dunas costeras encuentran refugio y alimento, y es por esta y muchas otras razones por las que resulta prioritario conocer y proteger más estos ecosistemas, conservando su integridad, sosteniendo los recursos naturales de los cuales vivimos, y disfrutando sanamente de este paisaje donde todos pueden convivir y cada cual tiene cabida.

- **Dormilona de cara negra** *(Muscisaxicola macloviana)*
- **Gaviota de Franklin** *(Leucophaeus pipixcan)*
- **Gaviota dominicana** *(Larus dominicanus)*
- **Playero grande** *(Tringa semipalmata)*
- **Pilpilén negro** *(Haematopus ater)*
- **Chorlo ártico** *(Pluvialis squatarola)*
- **Pilpilén** *(Haematopus palliatus)*
- **Pequén** *(Athene cunicularia)*
- **Minero** *(Geositta cunicularia)*
- **Zarapito común** *(Numenius phaeopus)*
- **Chorlo semipalmado** *(Charadrius semipalmatus)*
- **Playero blanco** *(Calidris alba)*
- **Chorlo nevado** *(Charadrius nivosus)*
- **Colegial** *(Lessonia rufa)*
- **Playero vuelvepiedras** *(Arenaria interpres)*
- **Dormilona de nuca rojiza** *(Muscisaxicola rufivertex)*
- **Gaviota garuma** *(Leucophaeus modestus)*

CECPAN
Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural