


Calendario Aves Migratorias del Archipiélago de Chiloé



La migración es un proceso que ocurre como parte del ciclo natural de las aves, esta obedece a movimientos regulares que responden a la estacionalidad y que compromete casi a la totalidad de la población de una especie.

Este calendario entrega información referente a cuando avistar a 4 diferentes especies de aves que visitan al archipiélago, estas son el Zarapito de pico recto, Zarapito común, Flamenco Chileno y Chorlo Chileno.

En este grupo de aves se presencia 2 tipos de migraciones, la Migración Boreal y la Migración Austral.



✈ Migración Boreal


Involucra el desplazamiento de individuos desde norte América hacia el sur de Sudamérica. Las especies comienzan a migrar entre julio y agosto, recorriendo miles de kilómetros para llegar a su destino.

✈ Migración Austral

Corresponde al desplazamiento de algunas especies de aves desde sus áreas de reproducción en el hemisferio sur hacia áreas más cálidas durante el invierno austral, migrando así septentrionalmente durante el otoño e invierno.



1. Chorlo Chileno (*Charadrius modestus*)



Los primeros individuos llegan las últimas semanas de febrero, luego entre los meses de abril a agosto ya es posible encontrar a todos los individuos migrantes. Durante el mes de septiembre y octubre estos retornan a tierras australes.

2. Flamenco Chileno (*Phoenicopterus chilensis*)

Algunos individuos comienzan a llegar de forma solitaria en el mes de febrero, es entre los meses de mayo a julio donde encontramos una mayor abundancia de esta especie. Durante el mes de agosto estos comienzan su regreso a sus áreas de reproducción.

3. Zarapito Común (*Numenius phaeopus*)



Comienzan a llegar los primeros migrantes a mediados de agosto, luego entre los meses de octubre y enero es donde lo encontramos en mayores concentraciones. A finales del mes de febrero los primeros ejemplares comienzan su retorno hacia el hemisferio norte.

4. Zarapito de Pico Recto (*Limosa haemastica*)

Los primeros ejemplares comienzan a llegar durante el mes de septiembre, en donde entre los meses de noviembre a febrero encontramos las mayores abundancias de la especie. Durante marzo y abril estos ya comienzan su retorno al hemisferio norte.

