

Proyecto de conservación de hábitats críticos para las aves playeras de los humedales de Huildad, Quellón y Yaldad

Humedales Marino - Costeros de Chiloé

Los humedales costeros están influenciados por las dinámicas que ocurren en la zona costera, así como también por la contribución de agua dulce que reciben provenientes de las cuencas. De esta forma todas sus cualidades surgen fundamentalmente desde la interacción y transición de ecosistemas terrestres y marinos, esta característica los hace ser ecosistemas altamente productivos y diversos.



2.

1.

C

A

4.


3.

D


B

Bosque submarino de Huiro

Banco de choritos




A. Marismas



B. Planicie intermareal



C. Hualves mareales



D. Mallín

1. Rayador (*Rynchops niger*)

3. Zarapito común (*Numenius phaeopus*)

2. Zarapito de pico recto (*Limosa haemastica*)

4. Chorlo chileno (*Charadrius modestus*)

Chiloé se caracteriza por la presencia de estos ecosistemas a lo largo de prácticamente toda su costa interior, los cuales son indispensables por los innumerables beneficios ecosistémicos que entregan. Entre otros, encontramos beneficios ambientales (hábitat para diversidad de especies, regulación hídrica, captura de carbono, control de erosión), socioeconómicos (provisión de alimentos, recursos, turismo) y culturales (recreación, identidad cultural y espiritual).